

**Estructura de la Materia 2**  
**Curso Verano 2012**  
**Guía 8: Dinámica de Redes y Propiedades Térmicas**

1. Hallar la relación de dispersión de fonones para una cadena lineal monoatómica con interacción a primeros vecinos.
2. Sea una cadena lineal formada por iones de masa  $m_1$  y  $m_2$  con interacciones a primeros vecinos  $C$ .
  - (a) Mostrar que la relación de dispersión es:

$$\omega^2(k) = \frac{C}{\mu} \left( 1 \pm \sqrt{1 - 2 \frac{\mu^2}{m_1 m_2} [1 - \cos(ka)]} \right)$$

( $\mu$  es la masa reducida.)

- (b) Encontrar la relación de amplitud  $u/v$  de las dos ramas de  $\omega^2(k)$  para  $k$  en el borde de zona ( $k = \frac{\pi}{a}$ ).
  - (c) Discutir la forma de la relación de dispersión y la naturaleza de los modos normales cuando  $m_1 \gg m_2$ .
  - (d) Comparar la relación de dispersión con la de la cadena monoatómica cuando  $m_1 \approx m_2$ . ¿Qué sucede cuando son iguales?
3. Hallar los modos normales de vibración de una cadena lineal monoatómica en la que las constantes de fuerza entre primeros vecinos son alternadamente  $C$  y  $10C$ . La distancia entre primeros vecinos es  $a/2$ . Encontrar  $\omega(k)$  en  $k = 0$  y  $k = \pi/a$ . Dibujar la relación de dispersión.
4. Calcular la matriz dinámica para un cristal unidimensional con una base de tres átomos, A-B-A, de masas  $m_A$  y  $m_B$ . La cadena tiene constante de red  $a$ , y las posiciones de los átomos en la celda unidad son  $x(B) = 0$ ,  $x(A_1) = a/3$  y  $x(A_2) = 2a/3$ , e interactúan con constantes de fuerza  $C_{AB}$  y  $C_{AA}$  entre primeros vecinos respectivos. Calcular las frecuencias y los autovectores en  $k = 0$ .
5. Sea una red rectangular plana monoatómica con parámetros de red  $a$  y  $b$ . Las constantes de fuerza entre átomos son  $C_1$  a primeros vecinos y  $C_2$  a segundos vecinos.
  - (a) Hallar la matriz dinámica del sistema, para una dirección de  $\mathbf{k}$  arbitraria en el plano.
  - (b) Graficar la relación de dispersión en el siguiente recorrido de la primera zona de Brillouin:  $\Gamma \rightarrow X \rightarrow S \rightarrow \Gamma \rightarrow Y \rightarrow S$ , donde  $\Gamma = (0,0)$ ,  $X = (\pi/a, 0)$ ,  $Y = (0, \pi/b)$ ,  $S = (\pi/a, \pi/b)$ .
  - (c) Hallar el límite para  $ka \approx kb \ll 1$ .

6. Un cristal bidimensional de celda unidad rectangular ( $a=a$ ,  $b=2a$ ) tiene dos átomos (A y B, masas  $m_A$  y  $m_B$ ) por celda unidad, ubicados en posiciones  $(0,0)$  (el A) y  $(0, 1/2)$  (el B). Los átomos interactúan entre sí a través de constantes de fuerza  $C_{AA}$ ,  $C_{BB}$  y  $C_{AB}$ , a primeros vecinos, entre los átomos AA, BB y AB respectivamente, y constantes  $C_4$  entre átomos AB a segundos vecinos. Hallar la matriz dinámica de este problema para vectores de onda  $k$  en la dirección del lado  $b$ . Hallar y graficar las curvas de dispersión correspondientes en esa dirección. (Ayuda: en esa dirección de  $k$  se separan los modos longitudinales de los transversales).
7. Sea un cristal cuya red es del tipo panel de abejas:
- ¿Cuántas ramas fonónicas acústicas y cuántas ópticas existen?. Dibujar cualitativamente las curvas de dispersión en alguna dirección del espacio recíproco.
  - Tomando constantes de fuerza  $C$  a primeros vecinos, hallar las curvas de dispersión para la dirección  $k = \alpha a^*$  correspondientes a modos longitudinales y transversales. ¿Cómo se explica que los modos transversales no dependen del valor de  $k$ ? ¿Qué suposición habría que cambiar para que esto no fuera así?
  - Graficar cualitativamente la densidad de estados restringida a esta dirección. En base a esto, dibujar cualitativamente  $C_v$  vs  $T$ .
8. Calcular las dispersiones de los modos longitudinales y transversales en la dirección  $(1,0,0)$  de una red FCC monoatómica con interacciones a primeros vecinos. Calcular la velocidad del sonido para estos modos.
9. A partir de la relación de dispersión de una cadena lineal monoatómica con interacciones a primeros vecinos encontrar la densidad de estados de fonones.
10. Suponiendo que la rama óptica en un sólido tridimensional tiene, cerca de  $k = 0$ , la forma  $\omega(k) = \omega_0 - Ak^2$ , mostrar que la densidad de estados correspondiente a esa porción de la banda óptica es:
- $$D(\omega) = \begin{cases} \left(\frac{L}{2\pi}\right)^3 2\pi A^{-3/2}(\omega_0 - \omega)^{\frac{1}{2}} & \omega \leq \omega_0 \\ 0 & \omega \geq \omega_0 \end{cases}$$
11. A bajas temperaturas el calor específico según el modelo de Debye tiene un comportamiento como  $T^3$ .
- ¿Cómo se modifica esta dependencia si se considera un sólido unidimensional? ¿Y uno bidimensional?
  - Imaginar un cristal formado por planos atómicos débilmente acoplados entre sí. ¿Qué forma tendrá el calor específico para  $T \rightarrow 0$ ?
12. Empleando la aproximación de Debye para el cálculo del calor específico en una cadena monoatómica ¿se sobreestima o se subestima este valor (comparado con el real) a altas temperaturas?

13. Un cristal puede ser descrito por el modelo de Debye-Einstein con frecuencia de Debye  $\omega_D$  y frecuencia de Einstein  $\omega_E$ ,  $\omega_E \gg \omega_D$ . Hacer un gráfico cualitativo de la densidad de estados fonónica  $D(\omega)$ , indicando claramente la condición de normalización. Hacer otro de  $c_v = c_v(T)$ , especificando su dependencia para  $T \rightarrow 0$  y para temperaturas altas. Considerar el problema en 1, 2 y 3 dimensiones.