


• C_2' (eje y, Fig 3) a través del punto medio de dos enlaces C-C opuestos causa un efecto de huso, apretando la molécula hacia el centro de masa.



Bibliografia
 [1] M. Willemowski, Z. Szekizynka, et al. *Magn. Reson. in Chem.* 35:262-268, 1997
 [2] (a) M. C. George, K. Coudane and S. Canalis. *J. Chem. Phys.* 126, 034507
 (b) K. Coudane and S. Canalis. *J. Chem. Phys.* 113:8132, 2000

[2] W. L. Jorgensen, J. Chandrosshah, *J. Chem. Phys.*, **79**, 926, (1983).

NB+1ra copa	-6
NB+1ra copa+cargas	-6
Experimental[5]	-5

[27] (a) D. Marhu, E. Suro, R. Carro, and J. Fornes

[1] *J. Phys. Chem. (1963-2002)* 59(1) - 51(12) (1995) 1-12. Wang and S. Zhang
[2] *Chem. Phys. Lett.* 530 (1999) 1-5. M. Kikuchi, Yu. Shenderov and V. Schlegel
[3] *J. Phys. Rev. B* 64 (2001) 235404 - 01. Rahmanghan and R. Plazek

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

126, 034507, 2007. (b) K. K. Coutinho, R. C. Guedes, B. 2003.
995, 107, 569-578.