

Langwellenbereich besonders von Heinrich Rubens vorgenommen, sollte noch über zwei Jahrzehnte währen. Die erwähnten Unvollkommenheiten der Theorie selbst und ihrer Beziehung zum Experiment haften übrigens jedem physikalischen Problem an.

In der Physikgeschichte werden jene beiden Schriften für "Meilensteine" gehalten, weil sich im 20. Jahrhundert herausgestellt hat, daß sie ein neues Feld der Physik erschlossen haben — ein Feld unter anderen, die gleichfalls etwa um diese Zeit aktuell wurden (z.B. Elektronenvorstellung, Röntgenstrahlen, Relativitätsprinzip, Kernstrahlen).

Quellen, die darüber Auskunft geben könnten, in welchen einzelnen Gedankenschritten Planck die Strahlungsgleichung und anschließend ihre statistische Begründung gefunden hat, sind so gut wie nicht erhalten. Denn der handschriftliche Nachlaß Plancks in Berlin ist im zweiten Weltkriege fast ganz verbrannt. So ist man im wesentlichen auf ein genaues Studium der Veröffentlichungen Plancks und seiner Zeitgenossen und Vorgänger sowie von Kongreßschriften angewiesen. Berücksichtigt man dabei angemessen auch die Schriften der Experimentatoren und versäumt es nicht, auch die Zahlenwerte nachzuprüfen, so läßt sich zumindest ein grobes Bild über die bis und um 1900 vorhandenen Möglichkeiten gewinnen, welche die Physiker hatten, um zu ihren Erkenntnissen zu gelangen und sie zu begründen. Dieses Bild kommt den tatsächlichen Ereignissen nahe. Spätere, rückblickende Erinnerungen Plancks und anderer Autoren zeigen nachweislich im allgemeinen diesen Wahrheitsgehalt nicht.

Hamburg  
Januar 1972

Hans Kangro

## 2. Ueber eine Verbesserung der Wien'schen Spectralgleichung<sup>1</sup>

von M. Planck.

(Vorgetragen in der Sitzung vom 19. October 1900.)  
(Vgl. oben S. 181.)<sup>1</sup><sub>a</sub>

Die von Hrn. Kurlbaum in der heutigen Sitzung mitgeteilten interessanten Resultate<sup>2</sup> der von ihm in Gemeinschaft mit Hrn. Rubens auf dem Gebiete der längsten Spectralwellen ausgeführten Energiemessungen haben die zuerst von den Herren Lummer und Pringsheim auf Grund ihrer Beobachtungen aufgestellte Behauptung nachdrücklich bestätigt, dass das Wien'sche Energieverteilungsgesetz nicht die allgemeine Bedeutung besitzt, welche ihm bisher von mancher Seite zugeschrieben worden war,<sup>3</sup> sondern dass dies Gesetz vielmehr höchstens den Charakter eines Grenzesetzes<sup>4</sup> hat, dessen überaus einfache Form nur einer Beschränkung auf kurze Wellenlängen bez. tiefe Temperaturen ihren Ursprung verdankt (1). Da ich selber die Ansicht von der Notwendigkeit des Wien'schen Gesetzes auch an dieser Stelle vertreten habe,<sup>5</sup> so sei es mir gestattet, hier kurz darzulegen, wie sich die von mir entwickelte elektromagnetische Theorie der Strahlung zu den Beobachtungsthatsachen stellt.

Nach dieser Theorie ist das Energieverteilungsgesetz bestimmt, sobald die Entropie  $S$  eines auf Bestrahlung ansprechenden linearen<sup>6</sup> Resonators als Function seiner Schwingungsenergie<sup>7</sup>  $U$  bekannt ist. Ich habe indes schon in meiner letzten Arbeit über diesen Gegenstand hervorgehoben (2), dass der Satz der Entropievermehrung an und für sich noch nicht hinreicht, um diese Function vollständig anzugeben;<sup>8</sup> zur Ansicht von der Allgemeinheit des Wien'schen Gesetzes wurde ich vielmehr durch eine besondere Betrachtung geführt, nämlich durch die Berechnung einer unendlich kleinen Entropievermehrung eines in einem stationären Strahlungsfelde befindlichen Systems von  $n$  gleichen Resonatoren auf zwei

(1) Auch Hr. Paschen hat, wie er mir brieflich mitteilte, neuerdings merkliche Abweichungen vom Wien'schen Gesetz festgestellt.

(2) M. Planck, *Ann. d. Phys.* 1 [=305], p. 730, 1900.



verschiedene Weisen, wodurch sich die Gleichung (1) ergab:

$$dU_n \cdot \Delta U_n \cdot f(U_n) = n dU \cdot \Delta U \cdot f(U),$$

wobei

$$U_n = nU \quad \text{und} \quad f(U) = -\frac{3}{5} \frac{d^2 S}{dU^2},$$

aus welcher dann das Wien'sche Gesetz in der Form hervor-  
geht:<sup>9</sup>

$$\frac{d^2 S}{dU^2} = \frac{\text{const.}}{U}.$$

In jener Functionalgleichung stellt der Ausdruck auf der rechten Seite sicher die genannte Entropieänderung dar, weil sich  $n$  ganz gleiche Vorgänge unabhängig voneinander abspielen, deren Entropieänderungen sich daher einfach addiren müssen. Dagegen würde ich es wohl für möglich, wenn auch immer noch für nicht leicht begreiflich und jedenfalls schwer beweisbar ansehen, dass der Ausdruck links nicht allgemein die ihm früher von mir zugeschriebene Bedeutung besitzt, mit anderen Worten: dass die Werte von  $U_n$ ,  $dU_n$  und  $\Delta U_n$  gar nicht hinreichen, um die fragliche Entropieänderung zu bestimmen, sondern dass dazu auch  $U$  selber bekannt sein muss.<sup>10</sup> Im Verfolg dieses Gedankens bin ich schliesslich dahin gekommen, ganz willkürlich Ausdrücke für die Entropie zu construiren, welche, obwohl complicirter als der Wien'sche Ausdruck, doch allen Anforderungen der thermodynamischen und elektromagnetischen Theorie ebenso vollkommen Genüge zu leisten scheinen wie dieser.

Unter den so aufgestellten Ausdrücken ist mir nun einer besonders aufgefallen, der dem Wien'schen an Einfachheit<sup>11</sup> am nächsten kommt, und der, da letzterer nicht hinreicht, um alle Beobachtungen darzustellen, wohl verdienen würde, daraufhin näher geprüft zu werden. Derselbe ergibt sich, wenn man setzt (2):

$$\frac{d^2 S}{dU^2} = \frac{\alpha}{U(\beta + U)}.$$

(1) l. c. p. 732.

(2) Ich gehe aus von dem zweiten Differentialquotienten von  $S$  nach  $U$ , weil diese Grösse eine einfache physikalische Bedeutung besitzt. (l. c. p. 731.)<sup>13</sup>

Er ist bei weitem der einfachste unter allen Ausdrücken, welche  $S$  als logarithmische Function von  $U$  liefern (was anzunehmen die Wahrscheinlichkeitsrechnung<sup>14</sup> nahe legt) und welche ausserdem für kleine Werte von  $U$  in den obigen Wien'schen Ausdruck übergehen. Mit Benutzung der Beziehung

$$\frac{dS}{dU} = \frac{1}{T}$$

und des Wien'schen „Verschiebungs“gesetzes (1) erhält man hieraus die zweiconstantige<sup>15</sup> Strahlungsformel:<sup>16</sup>

$$E = \frac{C\lambda^{-5}}{e^{c/\lambda T} - 1},$$

welche, soweit ich augenblicklich sehen kann, den Gang der seither publicirten Beobachtungszahlen ebenso befriedigend wiedergibt, wie die besten bisher aufgestellten Spectralgleichungen, nämlich die von Thiesen (2),<sup>17</sup> die von Lummer-Jahnke (3) und die von Lummer-Pringsheim (4). (Wird an einigen Zahlen<sup>18</sup> erläutert.) Ich möchte mir daher erlauben, Ihre Aufmerksamkeit auf diese neue Formel zu lenken, die ich vom Standpunkt der elektromagnetischen Strahlungstheorie aus nächst der Wien'schen für die einfachste halte.

(1) Der Ausdruck des Wien'schen Verschiebungsgesetzes ist einfach:<sup>19</sup>

$$S = f\left(\frac{U}{v}\right),$$

won  $v$  die Schwingungszahl des Resonators bedeutet. Ich werde dies bei einer anderen Gelegenheit darlegen.

(2) M. Thiesen, *Verhandl. d. Deutsch. Physikal. Gesellsch.* 2, p. 67, 1900. Dort findet sich auch bemerkt, dass Hr. Thiesen seine Formel schon aufgestellt hatte, ehe die Herren Lummer u. Pringsheim ihre Messungen auf grössere Wellenlängen ausdehnten, was ich hier hervorhebe, weil ich vor dem Erscheinen der citirten Publication eine etwas andere Darstellung gegeben hatte (*M. Planck, Ann. d. Phys.* 1 [=306], p. 719, 1900).

(3) O. Lummer u. E. Jahnke, *Ann. d. Phys.* 3 [=308], p. 288, 1900.

(4) O. Lummer u. E. Pringsheim, *Verhandl. d. Deutsch. Physikal. Gesellsch.* 2, p. 174, 1900.